

出穂予想と穂肥施用のポイントについて

JA 北越後営農販売部

【出穂予想：7月9日現在】

出穂は平年並からやや早まる見込み

～コシヒカリでも幼穂がわずかに確認され始めました～

■品種別出穂期予想と穂肥時期のめやす

品種名	幼穂形成期	出穂期	穂肥窒素 量合計 (kg/10a)	穂肥時期		湛水管理 開始時期
				1回目	2回目	
五百万石	7月1日	7月23日	1～2	7/3 (-20)	7/11 (-12)	6/28～
ゆきん子舞	7月4日	7月26日	5～6	7/1～7/3 (-25～-23)	7/12 (-14)	7/1～
つきあかり	7月3日	7月25日	5～6	6/30～7/2 (-25～-23)	7/11 (-14)	6/30～
こしいぶき	7月6日	7月28日	2～3	7/5 (-23)	7/14 (-14)	7/3～
コシヒカリ	7月14日	8月6日	1～3	7/19～7/22 (-18～-15)	7/27 (-10)	7/12～
あきだわら	7月22日	8月14日	5～6	7/20～7/22 (-25～-23)	7/31 (-14)	7/20～
わたぼうし	7月4日	7月26日	2～3	7/3～7/6 (-23～-20)	7/14～7/16 (-12～-10)	7/1～
こがねもち	7月9日	8月1日	1～3	7/14～7/17 (-18～-15)	7/22 (-10)	7/7～

- コシヒカリ、こがねもちは5月10日頃移植、その他品種は連休移植を基準に予想したものです。
- 出穂期は今後の気象状況により前後しますので、ほ場ごとの幼穂や葉色を確認するなど生育診断を実施し適正な穂肥を施用しましょう。